

## GUÍA DE EJERCICIOS DE SONIDO Y AUDICIÓN

**1-** Cuando se coloca un diapasón sobre el extremo abierto de un tubo, lleno de un gas, se observa que la mínima longitud del tubo que produce resonancia es 30 cm. Suponiendo que la frecuencia del diapasón es de 300 Hz, calcular la velocidad de propagación del sonido en el gas.

**2-** En los instrumentos musicales de viento (un extremo abierto), se denomina soprano al que tiene frecuencia fundamental más alta. Un clarinete soprano tiene una longitud de 58,9 cm. ¿Cuál es su frecuencia fundamental si se sabe que la velocidad de propagación del sonido en aire es 344 m/s?

**3-** Un instrumento musical de cuerda (extremos cerrados) posee cuerdas de 50 cm de longitud. Cuando la frecuencia de oscilación es 1020 Hz se forma una onda que contiene 6 nodos (contando ambos extremos)

- a) ¿Cuál es la velocidad de propagación de la onda en la cuerda?
- b) ¿Cuál es la longitud de la onda sonora que se propaga en el aire, si la velocidad de propagación en el aire es 340 m/s?

**4-** Una persona oye un sonido puro, cuya longitud de onda en el aire es 34,4 cm. El sonido proviene de un instrumento de cuerdas; cada una de estas mide 0,5 m. Las velocidades de propagación en el aire y en las cuerdas son 344 m/seg y 200 m/seg, respectivamente. La cantidad de nodos en la onda estacionaria de las cuerdas es

( Sugerencia: dibuje la onda estacionaria en la cuerda):

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8
- e) 10
- f) 12

**5-** La onda de sonido estacionaria fundamental que se forma en un tubo cerrado por ambos extremos tiene una frecuencia de 440 Hz. ¿Cuál de los siguientes cambios llevaría esa frecuencia al doble?

- a) abrir uno de los extremos.
- b) abrir ambos extremos.

- c) aumentar la longitud del tubo al doble.
- d) reducir la longitud del tubo a la mitad.
- e) aumentar la longitud del tubo al doble y abrir uno de los extremos.
- f) reducir la longitud del tubo a la mitad y abrir uno de los extremos.

**6-** Si nos encontramos a 10 m de una avenida concurrida el ruido tiene un nivel de intensidad de 70 dB. ¿Cuál es el nivel de intensidad si nos encontramos a 50 m de la avenida?

**7-** Un cohete explota a una altura de 400 m produciendo en un punto del suelo verticalmente debajo de él, una intensidad sonora media de  $6,2 \times 10^{-2} \text{ W/ m}^2$ . El nivel de intensidad sonora a una distancia de 10 m del cohete es ( $I_0 = 10^{-12} \text{ W/ m}^2$ ):

- a) 70 dB
- b) 108 dB
- c) 140 dB
- d) 76 dB
- e) 0 dB
- f) 150 dB

**8-** El nivel de intensidad sonora producida por una bocina a 25 m de distancia es de 90 dB. Otra bocina produce el mismo nivel a 50 m de distancia. Se cumple que:

- a) Las dos bocinas emiten con la misma potencia.
- b) A 25 m de distancia la segunda bocina produce un nivel de intensidad sonora de 180 dB.
- c) La potencia de la segunda bocina es el doble de la potencia de la primera bocina.
- d) A 25 m de distancia, la diferencia entre los niveles producidos por ambas bocinas es de 6 dB.
- e) Un oyente ubicado en un punto que esté a 25 m de la primera bocina y a 50 m de la segunda bocina, percibe un nivel de intensidad sonora de 180 dB.
- f) A 50 m de distancia, la primera bocina produce un nivel de intensidad sonora de 22,5 dB.

**9-** La frecuencia de la sirena de un patrullero detenido es 700 Hz. Una persona percibe este sonido como de frecuencia 770 Hz cuando el patrullero se le acerca con una velocidad  $v$ . Entonces, si el patrullero se

aleja de la persona con la misma velocidad  $v$ , la frecuencia del sonido escuchado (en Hz), suponiendo que la velocidad de propagación del sonido en el aire es 340 m/s será:

**10-** Una persona se desplaza desde Retiro a Tigre en tren a 72 km/h; en sentido contrario avanza otro tren a 30 m/s que acciona su bocina con una frecuencia de 1000 Hz. Antes de que ambos trenes se crucen, la frecuencia escuchada por la persona será (considerando la velocidad de propagación del sonido en el aire= 344 m/s):

- a) 1159 Hz
- b) 862 Hz
- c) 866 Hz
- d) 1031 Hz
- e) 1000 Hz
- f) 1191 Hz.

**11-** Un altoparlante emite un tono puro de 1 kHz, tal que a 50 m de distancia de la fuente el nivel de intensidad sonora es 80 dB (siendo  $I_0= 10^{-12} \text{W/m}^2$ ). Considerando que el medio no absorbe energía sonora, se cumple que:

- a) Para el doble de potencia sonora emitida, se obtiene un nivel de intensidad sonora de 160 dB a 50 m de distancia de la fuente
- b) A 100 m de distancia de la fuente, la intensidad sonora es  $80 \times 10^{-12} \text{W/m}^2$
- c) A 50 m de distancia de la fuente, la intensidad sonora es  $80 \times 10^{-12} \text{W/m}^2$
- d) A 100 m de distancia de la fuente, el nivel de intensidad sonora es 40 dB
- e) A 50 m de distancia de la fuente, la intensidad sonora es  $10^{-4} \text{W/m}^2$
- f) A 100 m de distancia de la fuente, el nivel de intensidad sonora es 20 dB

**12-** Si se escucha música con un nivel de 25 dB y luego se aumenta el volumen hasta alcanzar 28 dB, se cumple que:

- a) La intensidad de la onda sonora se multiplicó por 2 y su amplitud por  $\sqrt{2}$ .
- b) La intensidad de la onda sonora se multiplicó por 9 y su amplitud por 3
- c) La intensidad y la amplitud de la onda sonora aumentaron,

aproximadamente, 316 veces cada una

d) La intensidad de la onda sonora quedó igual pero su amplitud se triplicó

e) Se cuadruplicó la intensidad de la onda sonora y se duplicó su amplitud

f) La amplitud de la onda sonora aumentó unas 17,8 veces, aproximadamente, y su intensidad 316 veces.

**13-** El zumbido de un insecto produce, a cierta distancia, un nivel de intensidad sonora de 30 dB. Entonces, 100 de esos insectos zumbando simultáneamente producen, a la misma distancia, un nivel de intensidad sonora de:

a) 32 dB

b) 50 dB

c) 60 dB

d) 130 dB

e) 103 dB

f) 3000 dB

**14-** Desde un vehículo que se mueve a 72 km/h se emiten pulsos de ultrasonido de frecuencia 120 kHz. Estos pulsos se reflejan sobre otro móvil que viaja delante en la misma dirección y sentido a velocidad de 77,1 km/h. Calcular con qué frecuencia se reciben en el primer vehículo los pulsos reflejados. Velocidad del sonido: 340 m/s

**15-** El efecto Doppler se caracteriza por:

a) La variación de la frecuencia del sonido que se percibe cuando la fuente de este está en movimiento.

b) el movimiento ondulatorio de los líquidos cocleares.

c) distorsiones de la percepción a nivel coclear.

d) el bajo umbral auditivo debido a daños de las células ciliares.

e) el pequeño intervalo entre el umbral de audición y el umbral de dolor.

f) el incremento de la intensidad del sonido en un factor de 100.

**16-** Un sonido es 1000 veces más intenso que otro. Establecer la relación entre las perturbaciones de presión y las diferencias entre los niveles de intensidad, respectivamente.

a) 10 y 10 dB

b) 90 y 45 dB

- c) 8 y 8 dB
- d) 100 y 30 dB
- e) 31,6 y 30 dB
- f) 25,7 y 30 dB

**17-** Cuando un sonido alcanza un objeto que se mueve en el mismo sentido que ese sonido, se refleja

- a) con una velocidad mayor que la que traía.
- b) con una velocidad menor que la que traía.
- c) sin modificar su frecuencia ni su velocidad, aunque sí su longitud de onda.
- d) sin modificar su frecuencia ni su velocidad ni su longitud de onda.
- e) con una frecuencia mayor que la que traía.
- f) con una frecuencia menor que la que traía.

#### Respuestas de la guía de sonido y audición:

- 1- 360 m/s
- 2- 146 Hz
- 3- a)  $V_p = 204$  m/s; b)  $\lambda = 0,33$  m
- 4- c) 6 nodos
- 5- Reducir L a la mitad
- 6- 56 dB
- 7- 140 dB
- 8- d) A 25 m diferencia de 6 dB
- 9- 642 Hz
- 10- a) 1159 Hz
- 11- e) A 50 m de distancia de la fuente, la intensidad sonora es  $10^{-4}$  W/m<sup>2</sup>
- 12- a) La intensidad de la onda sonora se multiplicó por 2 y su amplitud por  $\sqrt{2}$ .
- 13- b) 50 dB
- 14- 119 kHz
- 15- a) La variación de la frecuencia del sonido que se percibe cuando la fuente de este está en movimiento.
- 16- e) 31,6 y 30 dB
- 17- f) con una frecuencia menor que la que traía.